



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 12 दिसम्बर 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	13/12/17	14/12/17	15/12/17	16/12/17	17/12/17
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	25	26	25	25	25
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	10	10	11	10	12
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	0	0	1	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	60	57	49	42	37
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	27	28	30	28	21
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	14	14	19	14	13
हवा की दिशा	उत्तर- पूर्व	उत्तर- उत्तर- पूर्व	उत्तर- उत्तर- पूर्व	उत्तर- पूर्व	उत्तर- पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
गेहूं		गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ति वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए 30-35 दिन की फसल पर 2.4-डी एस्टर साल्ट एक लीटर का पानी में घोल बनाकर प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव समान रूप से करे कही भी दोहरा छिड़काव न करें।
सरसों	वानस्पतिक	सरसों की फसल में बुवाई के 40-45 दिन बाद सिंचाई करें। फसल में छाछया रोग नियंत्रण के लिए प्रति हैक्टेयर 20 किलो गन्धक चूर्ण का भुरकाव करें।
प्याज	रोपाई	प्याज की फसल के लिए खेत तैयार कर रोपाई करें। रोपाई के समय 50 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस व 100 किलो पोटाश प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
पशु		पशुओं में न्यूमोनिया के लक्षण जैसे बुखार, दस्त, नाक व आंख से पानी आना दिखाई देने पर उसे तुरन्त अन्य स्वस्थ पशुओं से पृथक कर दें और निकटतम पशु-चिकित्सक से सलाह लें।

(नौडल ऑफीसर)