



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 12 फरवरी 2019

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	13/02/19	14/02/19	15/02/19	16/02/19	17/02/19
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	30	31	30	28	27
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	14	14	13	11	13
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	3	2	0	0	1
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	45	58	68	64	61
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	14	13	21	20	18
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	16	12	10	14	8
हवा की दिशा	पूर्व- उत्तर- पूर्व	दक्षिण- पश्चिम	पूर्व- दक्षिण- पूर्व	उत्तर- उत्तर- पूर्व	पूर्व- दक्षिण- पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
सरसों	दाना पकने की	सरसों की फसल में दाना पकने की अवस्था पर सिंचाई करें।
गेहूं		गेहूं व जौ की फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 4 लीटर प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें।
मैथी		मैथी की फसल में मोयला कीट के नियंत्रण हेतु फसल पर मैलाथियोन 50 ई.सी. एक मिली लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
लहसुन एवं प्याज		लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट (पर्ण जीवी कीट) के प्रकोप की सम्भावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसता है जिससे पत्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकतें पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
कुष्माण्ड कुल सब्जियां	खेत की तैयारी	कुष्माण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई हेतु खेत तैयार करें अन्तिम जुताई के समय 20-25 टन देशी खाद प्रति हैक्टेयर की दर से खेत में

(नौडल ऑफिसर)