



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 13 जून 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	14/06/17	15/06/17	16/06/17	17/06/17	18/06/17
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	41	40	40	39	39
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	29	28	28	26	26
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	3	2	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	47	48	46	46	46
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	16	16	15	15	15
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	10	11	10	12	12
हवा की दिशा	दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मूँगफली		मूँगफली में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के दो दिन बाद 3 लीटर पेंडीमेथालिन का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।
बाजरा	तैयारी	बाजरा की बुवाई के लिए आवश्यक आदानों बीज, उर्वरक व रसायनों की अग्रिम व्यवस्था करें ताकि समय पर बुवाई की जा सके।
टमाटर	नर्सरी	टमाटर की फसल के लिए नर्सरी तैयार एक हैक्टेयर के लिए 400–500 ग्राम बीज प्रयाप्त है।
लोकी तोरई, टिन्डा	बुवाई	कुषाण्ड कुल की सब्जियों की निम्न किस्मों की बुवाई करें। लोकी— पूसा नवीन व पूसा मेघदूत। तोरई— पूसा नसदार, पूसा चिकनी व अरका सुजात। टिन्डा— बीकानेरी ग्रीन, अरका टिन्डा लुधियाना।
पशु		पशुओं को गलघोंट व लंगडा बुखार रोग से बचाने के लिए वर्षा ऋतु से पहले टीकाकरण कराएं।

(नौडल ऑफीसर)