



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 16 अगस्त 2016

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

| मौसमी तत्व / दिनांक | 17/08/16 | 18/08/16 | 19/08/16 | 20/08/16 | 21/08/16 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| वर्षा (मि.मी.) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| अधिकतम तापमान (°सेल्सियस) | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 |
| न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस) | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| बादलों की स्थिति (ओक्टा) | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम | 42 | 40 | 36 | 34 | 32 |
| हवा की गति (कि.मी/घंटा) | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| हवा की दिशा | उत्तर- पश्चिम | पश्चिम -उत्तर- पश्चिम | पश्चिम -उत्तर- पश्चिम | पश्चिम -उत्तर- पश्चिम | पश्चिम |

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

| फसल | अवस्था | सलाह |
|------------------|-----------|---|
| बाजरा | सिट्टे | बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए सिट्टे निकलते समय 2 किलो मेन्कोजेब का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें। |
| मूंग, मोट, ग्वार | वानस्पतिक | किसान भाई दलहनी फसलो में निराई-गुडाई कर खरपतवार निकालें। |
| सब्जियां | पुष्पन | कुष्माण्ड कुल की सब्जियों में पुष्पन अवस्था पर 20 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें। |
| मिर्च | वानस्पतिक | मिर्च में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ई.सी की एक एम.एल मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। |

(नौडल ऑफीसर)