



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 16 अगस्त 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	17/08/17	18/08/17	19/08/17	20/08/17	21/08/17
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	1
अधिकतम तापमान ([°] सेल्सियस)	34	34	35	34	34
न्यूनतम तापमान ([°] सेल्सियस)	25	24	25	25	25
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	2	4	5	5
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	85	84	85	86	85
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	32	34	32	34	32
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	7	5	3	5	7
हवा की दिशा	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
		फसलों को सफेद लट के प्रकोप से बचाने के लिए चार लीटर क्यूनालफॉस 20 ई.सी. प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें।
मूँग व मोठ	पुष्पन	मूँग व मोठ की फसल को चित्ती जीवाणु रोग के नियंत्रण के लिए 200 ग्राम एग्रोमार्ईसीन का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।
कुम्बाण्ड कुल की सब्जियां	फूल व फल	कुम्बाण्ड कुल की सब्जियों में फल छेदक कीट के नियंत्रण कि लिए किसान भाई मैलाथियान 50 ई.सी. एक मिली लीटर का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
मूँगफली	सुइयां बनने की	किसान भाई मूँगफली की फसल में सुइयां बनना सुरु हाकने के बाद निराई-गुडाई बिल्कुल न करें।
भिण्डी	पुष्पन	भिण्डी की फसल में लाल मकड़ी के नियंत्रण हेतु मैलाथियान 50 ई.सी. सवा लीटर का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।
पशु		इस मौसम में हरे कच्चे चारे की उपलब्धता अधिक होती है जिसके ज्यादा खाने से दस्त होने की समस्या हो सकती है अतः हरे चारे को सीमित मात्रा में देना ही पशु के लिए लाभकारी रहता है।

(नौडल ऑफिसर)