



**मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं**  
**(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)**

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



**दिनांक: 18 अप्रैल 2019**

**जोधपुर**

**जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,**  
**जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान**

मौसमी तत्व / दिनांक	19-04-19	20-04-19	21-04-19	22-04-19	23-04-19
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	34	35	36	37	38
न्यूनतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	22	22	23	23	23
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	1	2	1	0
सापेक्षिक आर्द्धता (प्रतिशत) सुबह	75	74	76	74	75
सापेक्षिक आर्द्धता (प्रतिशत) शाम	25	25	26	26	24
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	6	9	9	7	7
हवा की दिशा	उत्तर— पूर्व	दक्षिण— पूर्व	दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम

**मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:**

फसल	अवस्था	सलाह
ककड़ी, खीरा, टिण्डा, तुरई,	फलन	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों में विषाणु (मोजैक वाइरस) रोग के कारण पत्तियां एंव फल बेड़ोल आकार के हो जाते हैं रोग के लक्षण दिखाई देते ही नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ई.सी. की 1.0 मिली लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।
कपास	तैयारी	कपास की बुवाई के लिए त्रिफाली या हैरो से दो तीन बार जुताई कर खेत तैयार करें तथा उन्नत किस्मों के बीज व्यवस्था करें।
जायद भिण्डी		भिण्डी की फसल में रेड माईट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक मि.ली का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
टमाटर		टमाटर की फसल में फल छेदक के प्रकोप से फल सङ्ग जाते हैं जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। इसके नियंत्रण हेतु इंडोक्साकार्ब 5 एस.सी. 500 मि.ली. का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

(नौडल ऑफीसर)