



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-01-2023

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-01-24 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-01-25	2023-01-26	2023-01-27	2023-01-28	2023-01-29
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	22.0	23.0	23.0	24.0	23.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	59	53	49	51	55
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	29	31	23	32	33
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	19.0	14.0	17.0	20.0	20.0
पवन दिशा (डिग्री)	26	217	85	25	40
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 22.0 से 24.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

जीरे की फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

29 जनवरी को कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की सम्भावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल में बालियां आना शुरू होने पर बुवाई के 70 दिन बाद सिंचाई करें। फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपायरीफास 4 लीटर प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें।
सरसों	सरसों की फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 ईसी @ 1.0 मिली का प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	इस मौसम में प्याज की समय से बोयी गई फसल में परपल ब्लोस रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाये जाने पर डाएथेन-एम-45 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
मेंथी	मेंथी की फसल फली अवस्था में है और इस समय तुलासिता रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
	ईसबगोल की फसल में फसल को तुलासिता (डाउनी मिल्ड्यू) रोग से बचाने के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	सर्द मौसम की स्थिति के कारण सुबह और रात में, शेड को गर्म रखें। शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें ताकि शेड में मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचा जा सके। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन नमक या 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन हरे चारे के साथ दें।