



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-11-2021

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-11-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| वर्षा (मिमी) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 26 | 27 | 37 | 36 | 22 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 12 | 12 | 15 | 19 | 13 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 86 | 61 | 58 | 58 | 80 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 30.0 से 32.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12.0 से 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

जिन किसानों ने गेहूं की बुवाई अभी तक नहीं की है। राज-4120, जी.डब्ल्यू-11, एच.डी-2967, के.आर.एल-210, के.आर.एल-13, राज-4238, राज-3077, राज-3777, राज-4037, राज-1482 व डब्ल्यू.एच-147 उन्नत किस्मों की बुवाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

सब्जी की फसलों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च में खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई-गुड़ाई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

| फसल | फसल विशिष्ट सलाह |
|-----|------------------|
|-----|------------------|

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जीरा | जीरे की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। बुवाई हेतु आर.जेड-19, आर.जेड-209, जी.जी-4 व आर.जेड-223 उन्नत किस्में हैं। बीज की मात्रा 12-15 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें। बुवाई से पूर्व बीज को 2 ग्राम कार्बेण्डेजिम या 4 ग्राम टाईकोडरमा विरिडी से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेण्डीमिथालिन एक किलो सक्रिय तत्व प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के बाद अंकुरण से पूर्व प्रयोग करें। |
| सरसों | सरसों में 30 दिन की फसल पर सिंचाई करें तथा इसी समय 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें। |
| चना | चने की 40 दिन की फसल पर प्रथम सिंचाई करें। फसल में दीमक के प्रकोप को कम करने के लिए चार लीटर क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें। |
| लहसुन | लहसुन की एक महा की फसल पर 50 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें। |

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गाय | नवजात पशुओं को सर्दी से बचाने का विशेष ध्यान रखें तथा रात के समय नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें। |