



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 30 जनवरी 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	31/01/18	01/02/18	02/02/18	03/02/18	04/02/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	32	33	32	32	31
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	10	11	11	12	12
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	2	1	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	78	76	75	75	74
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	15	14	12	11	11
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	5	4	3	2	5
हवा की दिशा	पूर्व	पूर्व	पूर्व—दक्षिण—पूर्व	पूर्व—दक्षिण—पूर्व	पूर्व—दक्षिण—पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मैथी, जीरा		मैथी व जीरा की फसल में मोयला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ई.सी. 1 मि.ली. लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
चना	फली	चने की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु मैलाथियान 50 ई.सी. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
सौंफ		सौंफ की फसल में मुख्य छत्रक निकलने की अवस्था पर बुवाई के 120 दिन बाद सिंचाई करें।
ग्रीष्मकालीन बौंगन	नर्सरी	ग्रीष्मकालीन बौंगन की फसल के लिए नर्सरी तैयार करे तथा क्यारियों में आवश्यकता के अनुसार गोबर की खाद डालें। बुवाई हेतु बीजदर 400–500 ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर रखें।
पशु		पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के विरुद्ध टिकाकरण कराएं।

(नौडल ऑफिसर)