



**मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं**  
**(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)**  
**केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003**



**दिनांक: 31 जनवरी 2020**

**जोधपुर**

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	01/02/20	02/02/20	03/02/20	04/02/20	05/02/20
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	24	25	24	25	26
न्यूनतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	10	10	10	11	10
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	0	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	57	59	58	57	53
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	21	18	18	16	17
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	9	13	13	11	14
हवा की दिशा	पूर्व	पूर्व— उत्तर— पूर्व	उत्तर— पूर्व	पूर्व— उत्तर— पूर्व	उत्तर— पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मैथी		मैथी में मोयला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ई.सी. 1 मि.ली. लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
जौ		जौ की फसल में सिंचाई करें तथा दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु कलोरपायरीफॉस 20 ई.सी. 4 लीटर प्रति हैक्टेयर दें।
सरसों		सरसों की फसल में दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई करें। फसल में माहू कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ईसी. सवा लीटर या डाइमिथोएट 30 ईसी. 875 मिली लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
ग्रीष्मकालीन भिण्डी		ग्रीष्मकालीन भिण्डी की फसल के लिए खेत तैयार करे जुताई करते समय खेत में देशी खाद 25 टन प्रति हैक्टेयर की दर से डालें।
पशु		मौसम में बदलाव होने की वजह से दिन के समय ज्यादा तापमान व रात के समय तापमान में कमी होने से पशुओं को अतिरिक्त तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर या पेड़ के निचे बांधें।

(नौडल ऑफिसर)