



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 18 अप्रैल 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	19/04/17	20/04/17	21/04/17	22/04/17	23/04/17
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	43	44	44	43	43
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	27	28	28	27	26
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	0	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	42	47	45	46	42
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	12	13	13	12	14
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	10	8	11	9	12
हवा की दिशा	पश्चिम- उत्तर- पश्चिम	पश्चिम- उत्तर- पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम- उत्तर- पश्चिम	पश्चिम- उत्तर- पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
कपास	बुवाई	कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और उन्नत किस्मों के बीजों की बुवाई करें। देशी कपास की आर.जी-8, आर.जी-18। अमेरिकन कपास की बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, आर.एस.टी-9,। बी.टी. कपास की एम.आर.सी.एच-6304, एम.आर.सी.एच-6025, एम. आर.सी.एच-314 व जे.के. सी.एच-1947 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बुवाई हेतु देशी कपास के लिए 12-15 किलो बीज, अमेरिकन के लिए 15-16 किलो व बी.टी. के लिए 2 किलो प्रति हैक्टेयर उपयोग में लें।
मिर्च	वानस्नतिक	मिर्च की फसल में रोपाई के 30 दिन बाद नत्रजन की 15-20 किलो ग्राम मात्रा प्रति हैक्टेयर दें।
कुष्माण्ड कुल की सब्जियां	पुष्पन	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों में विषाणु रोग के नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ई.सी. की 1.0 मिली लीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।
पशु		लू से बचाने के लिए पशुओं को दिन के समय छायादार स्थान पर बांधें तथा दिन में 3-4 बार पानी पिलाएं।

(नौडल ऑफीसर)